

## LAPAROSCOPIA CONVERTIDA EN LAPAROTOMÍA. REVISIÓN DEL AÑO 2000 EN EL HOSPITAL LA PAZ.

Alicia Guntiñas, M. Martín, M. Muñoz, P. De Andrés, M. Puch, A. Pérez Piñar, J. Santisteban.

**Objetivos:** Analizamos las laparoscopias convertidas a laparotomía en el año 2000 y estudiamos las causas que propiciaron la cirugía abierta.

**Material y métodos:** Recogimos los datos referentes a todas las laparoscopias realizadas durante el año referido, basándonos en la base de datos del quirófano. De estas pacientes nos centramos en aquellas codificadas como laparoscopia-laparotomía y revisamos la historia clínica, para obtener información sobre los antecedentes personales de la paciente, la indicación de realización de laparoscopia y el motivo de su conversión en laparotomía.

**Resultados:**

De un total de 609 laparoscopias realizadas en el centro en el año 2000:

- 62 (10,18%) fueron por embarazo ectópico,
- 171 (28%) para ligadura de trompas,
- 47 (7,7%) por estudio de esterilidad,
- 4 (0,65%) para second look de cáncer de ovario,
- en 5 (0,82%) se realizó fijación de vagina al sacro,
- 18 (2,95%) fueron histerectomías vaginales asistidas por laparoscopia y
- en las 302 restantes (casi el 50%) se realizó alguna otra intervención por laparoscopia. De estas últimas, 242 (39,7% del total) se hicieron por motivos anexiales. Finalmente, 17 (2,79%) se convirtieron en cirugía abierta. El motivo de la laparoscopia en este grupo fue por tumoración anexial en 13 de ellas, 3 por embarazo ectópico y una por hipovolemia secundaria a legrado, demostrándose importante hemoperitoneo por solución de continuidad en fondo de útero.

**Conclusiones:** Al analizar los motivos por los que una cirugía inicialmente cerrada se transforma en cirugía abierta influye, en primer lugar, la experiencia y habilidad del cirujano para resolver las dificultades que se presentan en cada caso. En segundo lugar, puede ser necesario completar la cirugía para la extracción de grandes miomas. En tercer lugar, la resolución de complicaciones inherentes a la técnica. La incidencia de conversión de laparoscopia en laparotomía, en los casos estudiados en esta comunicación, es comparativamente baja.